

Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, modalidades multiprofissional e uniprofissional, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - 2023

ODONTOLOGIA

05/11/2022

CADERNO DE QUESTÕES

DISCIPLINAS	QUESTÕES
Saúde Pública	01 a 20
Conhecimentos Específicos da Área	21 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique ao fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

PROCESSO SELETIVO

QUESTÃO 01

Muitos países implementaram intervenções para reduzir a transmissão e frear a rápida evolução de Covid-19. Essas medidas sanitárias incluem: o isolamento de casos, o incentivo à higienização das mãos, a adoção da etiqueta respiratória, o uso de máscaras faciais, o distanciamento social, o fechamento de escolas e universidades, as proibições de viagens, dentre outras. No Brasil, não diferente dos outros países, a inexistência de vacinas e terapêuticas específicas levou os profissionais de saúde a implantarem uma série de medidas de saúde pública não farmacológicas, similares às medidas implantadas mundialmente, visando a evitar:

- (A) as internações de pacientes idosos, tendo em vista que as comorbidades são comuns nesse grupo.
- (B) o esgotamento do sistema de saúde e as mortes em decorrência da superlotação das unidades.
- (C) a superlotação das unidades básicas, secundárias e terciárias de saúde e de reabilitação.
- (D) o estabelecimento de protocolos de manejo clínico para casos suspeitos e confirmados de SARS-CoV.

QUESTÃO 02

O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil foi em fevereiro de 2020, sendo o paciente um homem que havia retornado de viagem da Europa. A partir desse registro, os casos se expandiram para todas as regiões brasileiras, levando a uma grave crise sanitária e política. Essa situação levou os governos federal, estaduais e municipais a fortalecerem

- (A) o Programa Nacional de Humanização, com a produção de vacinas em larga escala.
- (B) as notificações de todos os casos confirmados, ignorando os casos suspeitos.
- (C) a reorganização imediata da Rede Terciária de Atenção à Saúde.
- (D) as medidas rígidas de vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 03

A influenza é uma doença sazonal, de ocorrência anual, com padrão de sazonalidade que varia entre as regiões brasileiras, sendo mais frequentes naquelas com estações climáticas bem definidas, ocorrendo com mais frequência nos meses mais frios. A importância da influenza como questão de saúde pública cresceu a partir do ano de 2009, quando se registrou a primeira pandemia do século XXI, devido ao vírus influenza (H1N1). No ano de 2014 foi regulamentado o incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde, dentre eles a Vigilância Sentinela da Influenza, que tem como um de seus objetivos

- (A) contribuir com a composição de novas vacinas contra a influenza.
- (B) isolar espécimes virais de amostras colhidas, em crianças, para envio ao Centro Colaborador de Influenza.
- (C) conhecer a patogenicidade e virulência do vírus influenza a cada período de três anos.
- (D) garantir a representatividade mínima da circulação viral das regiões mais frias do país.

QUESTÃO 04

A Lei n. 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção, a recuperação, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, define, dentre seus princípios, a participação popular, que se faz importante por contribuir para elencar prioridades e influir nos serviços públicos de saúde, garantindo que a população participe do processo de formulação e controle das políticas públicas de saúde. A participação popular se dá por meio

- (A) do poder legislativo.
- (B) dos conselhos de profissionais de saúde.
- (C) dos conselhos de saúde.
- (D) do poder judiciário.

QUESTÃO 05

O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) cujo objetivo é diminuir as desigualdades, tratando de forma desigual os desiguais, dando mais a quem tem menos, é chamado de

- (A) integralidade.
- (B) hierarquização.
- (C) universalidade.
- (D) equidade.

QUESTÃO 06

A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como objetivo a promoção da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde relacionados aos determinantes e aos condicionantes sociais. Para a efetivação dessa política, é necessária a interlocução entre

- (A) os governos estaduais, os conselhos municipais e as unidades de saúde.
- (B) os governos estaduais, os conselhos estaduais e os conselhos municipais de saúde.
- (C) o governo federal, os governos estaduais e os conselhos municipais de saúde.
- (D) o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais.

QUESTÃO 07

Os princípios e as diretrizes, a caracterização e a relação dos serviços ofertados na atenção básica de saúde serão orientadores para a organização do sistema de saúde nos municípios. O princípio da universalidade possibilita o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizando-os como a porta de entrada do usuário, por meio da

- (A) atenção psicossocial.
- (B) rede de atenção à saúde.
- (C) urgência e emergência.
- (D) atenção secundária à saúde.

QUESTÃO 08

As atribuições dos profissionais das equipes de saúde da atenção básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federais, estaduais, municipais e/ou do Distrito Federal. Quais são as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica à saúde?

- (A) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da atenção básica vigente.
- (B) Realizar a estratificação de risco e elaborar o plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
- (C) Cadastrar os procedimentos de curativos, de administração de medicamentos, de vacinas, de coleta de material para exames, de lavagem, de preparação e de esterilização de materiais.
- (D) Realizar o diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal do território.

QUESTÃO 09

A *Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde* elaborou e aprovou uma declaração essencial e norteadora que define as atividades primárias que devem compor os conceitos de cuidados primários, incluindo a educação sanitária, a assistência nutricional, o saneamento básico, a assistência materno infantil, o planejamento familiar, as imunizações e a assistência curativa para os problemas mais comuns. O documento elaborado nessa conferência foi a

- (A) Carta de Ottawa.
- (B) Constituição Federal.
- (C) Declaração de Alma-Ata.
- (D) Política de promoção de saúde.

QUESTÃO 10

As políticas públicas de saúde são programas, ações e decisões tomadas pelos governos federal, estaduais e municipais, com a finalidade de melhorar as condições de saúde da população. Dentre as várias políticas públicas de saúde adotadas pelo governo brasileiro, destaca-se a *Política Nacional de Promoção de Saúde* (PNPS), que aponta temas prioritários para atuação, tais como: formação e educação permanente, alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, enfrentamento ao uso do tabaco e seus derivados, enfrentamento ao uso abusivo de álcool e de outras drogas, promoção da mobilidade segura e promoção da cultura da paz e dos direitos humanos. O profissional de saúde pode trabalhar esses temas elencados na PNPS como prioritários

- (A) nas escolas, nas universidades e na comunidade.
- (B) nas unidades de reabilitação, nas reuniões de gestores de saúde e na comunidade.
- (C) nos conselhos estaduais e municipais de saúde e em reuniões bipartites.
- (D) nos níveis primário, secundário e terciário de saúde.

QUESTÃO 11

As emergências em saúde pública, em especial aquelas declaradas em decorrência de uma pandemia, revelam as fragilidades das políticas sociais e de saúde, que são expressas em insuficiente capacidade estatal para lidar com uma emergência sanitária complexa. Diante da situação, o que podem contribuir para garantir o acesso do usuário no sistema de saúde?

- (A) A readequação da retaguarda diagnóstica e o fortalecimento da atenção terciária.
- (B) A readequação do sistema de atendimento às urgências e emergências.
- (C) A readequação da estruturação da rede de atenção psicossocial.
- (D) A readequação do sistema e a articulação com a vigilância e a atenção à saúde.

QUESTÃO 12

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de emergência em saúde pública de importância internacional, em julho de 2022, devido ao surto de *Monkeypox*, também conhecida como Variola dos Macacos. A *Monkeypox* é uma zoonose viral endêmica, de notificação compulsória e de baixo potencial pandêmico, que pode ser transmitida principalmente por meio do contato íntimo durante as relações sexuais, de erupções de cutâneas ativas, de fluidos corporais, de gotículas respiratórias e de roupas e objetos contaminados. É considerado caso confirmado de *Monkeypox* quando

- (A) o paciente teve contato direto com casos prováveis ou confirmados, com lesões de mucosa de início súbito, erupção cutânea aguda única ou múltipla em qualquer parte do corpo.
- (B) o paciente teve resultado laboratorial positivo/detectável, por diagnóstico molecular em tempo real e/ou sequenciamento.
- (C) o paciente teve exposição próxima sem proteção respiratória, ou história de contato íntimo, com caso provável ou confirmado nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.
- (D) o paciente teve contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho, pertencentes a paciente com caso provável ou confirmado nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.

QUESTÃO 13

A comunicação da notificação de casos suspeitos/prováveis/confirmados de *Monkeypox* deve ser realizada aos serviços de vigilância em saúde pelo profissional que realizou o atendimento no período máximo de

- (A) 6 horas.
- (B) 12 horas.
- (C) 24 horas.
- (D) 36 horas.

QUESTÃO 14

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública do Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Para sua efetivação no cotidiano, essa política deve ser trabalhada por meio de cursos e de oficinas de formação/intervenções e a partir da discussão dos processos de trabalho do cotidiano nas unidades

- (A) de atenção básica de saúde, incluindo as equipes do atendimento pré-hospitalar fixo.
- (B) de atenção secundária e terciária, envolvendo gestores, servidores e usuários.
- (C) de atenção primária, secundária e terciária, envolvendo gestores e servidores.
- (D) de atenção primária, secundária e terciária, envolvendo gestores, servidores e usuários.

QUESTÃO 15

A Política Nacional de Humanização (PNH) caminha no sentido de inclusão nos processos de produção de saúde dos diferentes agentes envolvidos, incluindo os diferentes sujeitos, analisadores sociais e o coletivo. Quais são os efeitos esperados dessa política?

- (A) A redução de filas e do tempo de espera, o atendimento acolhedor, a garantia dos direitos do usuário, a valorização do trabalho na saúde e a gestão participativa.
- (B) A redução de filas e tempo de espera, o atendimento acolhedor, a garantia dos direitos do usuário, a valorização do trabalho na saúde com melhores salários e a gestão participativa.
- (C) O atendimento acolhedor, a garantia dos direitos do usuário, a valorização do trabalho na saúde e a gestão participativa.
- (D) O atendimento acolhedor, a garantia dos direitos do usuário, a valorização do trabalho na saúde com melhores salários e a gestão participativa.

QUESTÃO 16

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações de Campo e da Floresta expressa o compromisso político em garantir o direito e o acesso à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando os princípios fundamentais da equidade, da universalidade e da integralidade. Para a aplicabilidade dessa política, algumas particularidades devem ser consideradas, como:

- (A) a decisão do gestor local para a destinação de recursos e a expansão dos serviços, a fim de garantir o princípio da equidade.
- (B) a população flutuante, que dispensa a necessidade da etapa do planejamento das ações.
- (C) a transversalidade envolvendo compromisso das áreas, dos setores e das instituições que compõe o SUS.
- (D) a necessidade da atuação das esferas estadual e municipal.

QUESTÃO 17

As doenças e os acidentes relacionadas às populações do campo e das florestas são agravos previsíveis e, portanto, evitáveis. Tratam-se, principalmente, de doenças osteomusculares, mentais, infecciosas, intoxicações pelo uso de agrotóxicos e provocadas por vetores. Pensando em uma forma de mitigar esses agravos, os profissionais de saúde podem associar a Política Nacional de Saúde Integral das Populações de Campo e da Floresta a outra política pública existente do governo federal, a qual engloba ações prioritárias de formação e educação permanente, alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, enfrentamento ao uso do tabaco e seus derivados, enfrentamento ao uso do álcool e outras drogas, promoção da mobilidade segura e da cultura da paz e dos direitos humanos e promoção do desenvolvimento sustentável. Essa situação descreve

- (A) o Programa Nacional de Imunização.
- (B) o Programa Nacional de Controle de Tabagismo.
- (C) a Política Pública para Populações indígenas.
- (D) a Política Nacional de Promoção de Saúde.

QUESTÃO 18

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida pela Portaria n. 4.270 de 2010, do Ministério da Saúde, como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes tecnologias que, integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Seu objetivo é promover

- (A) a participação efetiva do cidadão e da comunidade no processo de contratualização, nomeadamente por meio da participação organizada e permanente dos usuários.
- (B) a integração sistêmica de ações e de serviços de saúde, com provisão de atendimento contínua, integral, de qualidade responsável e humanizada.
- (C) a participação efetiva do cidadão e da comunidade no processo de contratualização, nomeadamente por meio da participação organizada e permanente das redes filantrópica e particular de saúde.
- (D) a integração sistêmica de ações e serviços de saúde de assistência e de vigilância com provisão de atendimento contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.

QUESTÃO 19

Quais são os três elementos constitutivos da operacionalização da Rede de Atenção à Saúde (RAS)?

- (A) A gestão clínica, as linhas de cuidado e a gestão da condição de saúde.
- (B) A população/região de saúde, a estrutura operacional e o sistema lógico de funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde.
- (C) A gestão clínica, as linhas de cuidado e a gestão de casos.
- (D) A população/região de saúde, a estrutura operacional e o sistema lógico de funcionamento determinado pelo modelo de vigilância em saúde.

QUESTÃO 20

Para assegurar a resolutividade da Rede de Atenção à Saúde (RAS), alguns fundamentos precisam ser considerados, dentre eles, a suficiência, que significa o conjunto de ações e serviços disponíveis, em quantidade e qualidade, para atender às necessidades de saúde da população, a qual inclui assistência primária, secundária e terciária, envolvendo os cuidados

- (A) de reabilitação, paliativos e preventivos.
- (B) de promoção, prevenção à saúde e paliativos.
- (C) de reabilitação, paliativos e promoção da saúde.
- (D) de reabilitação, de prevenção à saúde e paliativos.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

É uma alteração endócrina no paciente que apresenta altos riscos de arritmias cardíacas ou falência, quando o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico. Trata-se de

- (A) diabetes Mellitus.
- (B) hipotireoidismo.
- (C) hipertireoidismo.
- (D) diabetes Insipidus.

QUESTÃO 22

Em radiologia, para facilitar a obtenção de um diagnóstico, frequentemente são utilizadas expressões descritivas para os aspectos encontrados em alguns quadros clínicos. Das expressões citadas abaixo, a que representa o aspecto observado para a doença de Paget, em uma tomada radiográfica, é

- (A) o floco de algodão.
- (B) o raio de sol.
- (C) o vidro moído.
- (D) a casca de cebola.

QUESTÃO 23

Leia a descrição a seguir.

É uma doença autoimune crônica com manifestações sistêmicas que envolvem principalmente as glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia e xerofalmlia. Esse agravo afeta principalmente mulheres de meia idade.

Qual é a síndrome descrita?

- (A) Behçet.
- (B) Sjogren.
- (C) Treacher-Collins.
- (D) Apert.

QUESTÃO 24

É a doença que se caracteriza pela reabsorção e pela aposição anormal de osso que resulta em distorção e enfraquecimento dos ossos afetados pelas vértebras lombares; pélvis, crânio e fêmur são os ossos mais afetados. Quando envolve os maxilares, ela causa deformidades, levando a um quadro chamado de leontíase óssea. Trata-se da

- (A) osteosclerose idiopática.
- (B) displasia fibrosa monostótica.
- (C) displasia fibrosa poliostótica.
- (D) doença de Paget.

QUESTÃO 25

A Cantopexia ou fixação transnasal com fio é um procedimento que o cirurgião Buco-Maxilo-Facial deve realizar, quando necessário, para melhor tratamento de algumas fraturas do terço médio da face. Esse procedimento envolve a fixação e a estabilização do fragmento ósseo contendo o ligamento cantal medial nas fraturas

- (A) do tipo Naso Orbito Etmoidais.
- (B) da Maxila tipo Le Fort II.
- (C) dos Ossos Próprios do Nariz.
- (D) da Maxila tipo Le Fort III.

QUESTÃO 26

Qual radiografia é indicada para avaliação das fraturas do 1/3 médio da face?

- (A) Towne.
- (B) Waters.
- (C) Panorâmica.
- (D) Lateral oblíqua.

QUESTÃO 27

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, 35 anos, apresenta trauma buco maxilo facial grave, com fraturas extensas do 1/3 médio da face e mandíbula bilateral. Apresenta sangramentos abundantes pela cavidade bucal e nasal.

A via mais adequada para oferecer oxigênio a esse paciente é

- (A) a traqueostomia.
- (B) a intubação nasotraqueal.
- (C) a intubação orotraqueal.
- (D) a intubação por Fibroscopia.

QUESTÃO 28

Segundo Fonseca et al (2013), a membrana cricótireoidea é uma referência anatômica importante, pois é a localização para a realização da cricótireotomia. Qual é a sua localização anatômica?

- (A) Ela fica acima da cartilagem tireoide e abaixo da cartilagem cricoide.
- (B) Ela está acima do primeiro anel traqueal e abaixo da cartilagem cricoide.
- (C) Ela se encontra abaixo da cartilagem tireoide e acima da cartilagem cricoide.
- (D) Ela se encontra entre o primeiro e segundo anéis da traqueia.

QUESTÃO 29

A forma mais comum de choque, o choque hipovolêmico, resulta de uma perda rápida do volume intravascular. A resposta fisiológica é diretamente proporcional ao volume de sangue que é perdido e pode ser classificada pela percentagem dessa perda. Segundo Fonseca et al (2013), a hemorragia de classe II corresponde a uma perda de volume de sangue

- (A) entre 10% e 20%.
- (B) entre 30 e 40%.
- (C) entre 20% e 30%.
- (D) entre 40% e 50%.

QUESTÃO 30

Segundo Fonseca et al (2013), a veia retromandibular é formada pela junção das veias

- (A) angular e facial.
- (B) angular e maxilar.
- (C) temporal superficial e facial.
- (D) temporal superficial e maxilar.

QUESTÃO 31

A Neuralgia do Trigêmeo é um tipo de dor facial neuropática, ocorrendo mais frequentemente em pacientes com idade superior a 50 anos (incidência 8:100.000; relação entre mulher e homem 1,6:1. Segundo Hupp et al (2021), os sintomas da Neuralgia do Trigêmeo são dor do tipo

- (A) aguda, elétrica, intensa, com duração de minutos até hora, com zona de gatilho presente.
- (B) aguda, elétrica, intensa, com breve duração de segundos a poucos minutos, com zona de gatilho presente.

(C) crônica, elétrica, com longa duração de minutos, normalmente uma zona de gatilho está presente.

(D) crônica, elétrica, com longa duração de horas, zona de gatilho ausente.

QUESTÃO 32

Segundo Hupp et al. (2021), um paciente apresentando clinicamente uma dor crônica na articulação temporomandibular, com dor aguda variável e episódica, cefaleias, restrição de movimento variável e curso ondulante e radiograficamente, alterações degenerativas precoces a moderadas de tecido duro enquadra-se na seguinte classificação de *Wilkes*.

- (A) 2 - Estágio inicial/intermediário.
- (B) 3 - Estágio intermediário.
- (C) 4 - Estágio intermediário/avançado.
- (D) 5 - Estágio avançado.

QUESTÃO 33

A Artrocentese é uma técnica minimamente invasiva que envolve a colocação de peças (agulhas ou cânulas pequenas) no interior da Articulação temporomandibular (ATM) para lavagem da articulação e rompimento de pequenas aderências. Segundo Hupp et al (2021), o uso mais comum parece ser nos pacientes com

- (A) deslocamento de disco com redução.
- (B) deslocamento de disco sem redução.
- (C) subluxação da ATM.
- (D) luxação recidivante da ATM.

QUESTÃO 34

A Displasia Fibrosa é uma condição do desenvolvimento semelhante a tumor, caracterizada pela substituição de osso normal por proliferação excessiva de tecido conjuntivo fibroso celular entremeado com trabéculas ósseas irregulares. A principal característica radiográfica na Displasia Fibrosa Monostótica dos maxilares é a de

- (A) "Favo de Mel".
- (B) "Vidro Fosco".
- (C) "Casca de Cebola".
- (D) "Raquete de Tênis".

QUESTÃO 35

Durante uma cirurgia ortognática, o septo nasal pode ser desviado, particularmente na osteotomia Le Fort I. Entre os movimentos da maxila, qual é o que apresenta maior chance de mudar a posição do septo durante a cirurgia?

- (A) Reposição inferior da maxila.
- (B) Recuo da maxila.
- (C) Avanço da maxila.
- (D) Reposição superior da maxila.

QUESTÃO 36

O mecanismo mais comum de síncope é uma queda repentina na liberação do sangue para o cérebro. A síncope vasodepressora (desmaio comum) e a hipotensão ortostática são os exemplos clínicos encontrados com maior frequência. Distúrbios fisiológicos que diminuem o suprimento sanguíneo ao cérebro incluem

- (A) a vasoconstrição das arteríolas periféricas.
- (B) a aumento agudo no débito cardíaco.
- (C) a dilatação da carótida interna.
- (D) as arritmias ventriculares fatais.

QUESTÃO 37

O instrumento que deve ser incluído no *kit* básico de emergências do consultório e que é designado para permitir a remoção de objetos pequenos e grandes da parte distal da cavidade oral e da faringe é a

- (A) Pinça de Magill.
- (B) Pinça Hemostática.
- (C) Pinça Clínica.
- (D) Pinça Pean.

QUESTÃO 38

A tireotoxicose, também conhecida como *hipertireoidismo*, começa de forma insidiosa e pode progredir, caso deixada sem tratamento, chegando a uma forma mais severa de desordem: a tempestade da tireoide ou crise da tireoide. A tempestade da tireoide representa um súbito e severo agravamento dos sinais e dos sintomas da tireotoxicose, normalmente acompanhada por hiperpirexia. É causa de hipertireoidismo

- (A) a Tireoidite de Hashimoto.
- (B) o Adenoma da Pituitária.
- (C) a Doença de Graves, bócio tóxico difuso.
- (D) a Doença Hipotalâmica.

QUESTÃO 39

A metemoglobinemia tóxica ou adquirida ocorre após administração de altas doses de qual solução anestésica?

- (A) Lidocaína.
- (B) Prilocaina.
- (C) Articaina.
- (D) Mepivacaína.

QUESTÃO 40

O primeiro regime antibiótico profilático para a implantodontia foi proposto em 1981 pela equipe liderada pelo sueco Per-Ingvar Brånemark, médico ortopedista responsável pela descoberta do princípio da osseointegração. Era recomendado o emprego de 1g de penicilina V, administrado 1h antes da intervenção, dose esta que era mantida a cada 8h pelo período de 10 dias. Qual regime antibiótico profilático em implantodontia é recomendado com base no grau de invasividade e na dificuldade do procedimento?

- (A) Intervenção que envolva o seio maxilar (Amoxicilina 875 mg + Clavulanato de potássio 125 mg).
- (B) Exodontias de elementos não infectados e colocação de implantes unitários (Clindamicina 600 mg).
- (C) Exodontias com enxerto alveolar e inserção imediata do implante (Amoxicilina 500mg).
- (D) Inserção de implantes múltiplos logo após as exodontias (Amoxicilina 2g).

QUESTÃO 41

As interações farmacológicas são classificadas como farmacocinéticas, quando ocorrem durante a absorção, distribuição, metabolização ou excreção dos fármacos; ou farmacodinâmicas, quando se dão nos locais de ação dos fármacos envolvidos, por meio de mecanismos pelos quais os efeitos se manifestam. Quando a interação produz uma resposta exagerada, maior que a conseguida com ambos os fármacos administrados individualmente, na máxima dose efetiva, é considerado

- (A) antagonismo.
- (B) sinergismo.
- (C) potencialização.
- (D) somação.

QUESTÃO 42

Leia o texto a seguir.

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos e do aperfeiçoamento das técnicas de condicionamento, o tratamento odontológico continua não sendo prazeroso ou agradável a ninguém. Ainda é comum se defrontar com pacientes extremamente ansiosos ou apreensivos, alguns deles tomados de verdadeiro pânico ou pavor ao se sentarem na cadeira do cirurgião-dentista.

Apesar da comprovada eficácia e segurança clínica, muitos cirurgiões-dentistas ainda apresentam certa resistência e insegurança ao prescrever benzodiazepínicos, provavelmente pela falta de conhecimento de alguns aspectos relacionados a sua farmacologia. Em caso de uso do ácido gama-aminobutírico, espera-se que ele

- (A) induza ao fechamento dos canais de cloreto (Cl^-) da membrana dos neurônios, amplificando o influxo desse ânion para dentro das células.
- (B) aja como se fosse um "ansiolítico natural ou fisiológico", o que resulta, em última análise, no aumento da excitabilidade e na propagação de impulsos excitatórios.
- (C) facilite a ligação do (GABA), aos receptores do sistema límbico.
- (D) potencialize os efeitos excitatórios do neurotransmissor (GABA), produzido pelo próprio organismo.

QUESTÃO 43

Atualmente, os conceitos de saúde pessoal e saúde coletiva têm sido difundidos na cultura das sociedades por meio da educação familiar e escolar e reforçados por diretrizes governamentais e campanhas publicitárias. No passado, entretanto, medidas de higiene para o controle de doenças infecciosas não eram divulgadas e, conseqüentemente, mostravam-se pouco compreendidas pela população. Profissionais da saúde devem ser orientados a trabalhar dentro de protocolos que impeçam a disseminação dos microrganismos patogênicos, antes, durante e após o atendimento do paciente. A redução do número de microrganismos viáveis para níveis considerados seguros pelos padrões da saúde pública é denominada de

- (A) antissepsia.
- (B) descontaminação.
- (C) esterilização.
- (D) desinfecção.

QUESTÃO 44

O dente incluso deve ser removido, a menos que a remoção seja contraindicada. A remoção desses dentes torna-se mais difícil conforme o avanço de idade do paciente. Em geral, o cirurgião-dentista não deve recomendar que os dentes sejam deixados no lugar até causarem problemas. Se isso acontecer, o paciente pode experimentar maior morbidade tecidual, perda de dentes ou ossos adjacentes, dentre outros. Qual o fator que torna a cirurgia do dente incluso mais difícil?

- (A) Raízes cônicas e fusionadas.
- (B) Posição mesioangular.
- (C) Posição distoangular.
- (D) Raízes com um terço ou dois terços formado.

QUESTÃO 45

As anormalidades faciais podem ser tratadas, com frequência, por procedimentos isolados na mandíbula ou na maxila e no terço médio da face. Como as anormalidades podem obviamente ocorrer na maxila e na mandíbula, a correção cirúrgica necessita de uma combinação de procedimentos cirúrgicos. A técnica popular para correção do prognatismo primeiramente descrita por Trauner e Obwegeser e depois modificada por Dalpont, Hunsick e Epker é o

- (A) osteotomia mandibular subapical.
- (B) osteotomia com separação sagital.
- (C) osteotomia vertical do ramo.
- (D) osteotomia de corpo com ressecção.

QUESTÃO 46

Quando uma estrutura óssea apresenta imperfeição no tamanho, na forma, na posição ou no volume, a cirurgia reconstrutora pode substituí-la. O osso é o tecido mais comumente usado para substituir o tecido ósseo perdido. Os enxertos ósseos têm sido usados há vários séculos com graus variados de sucesso. O enxerto que produz maior concentração de células osteogênicas é o

- (A) aloenxerto.
- (B) xenoenxerto.
- (C) heteroenxerto.
- (D) autoenxerto.

QUESTÃO 47

Uma das áreas mais difíceis e mais gratificantes da prática odontológica e cirúrgica é o tratamento do paciente vítima de traumatismo bucal ou facial. Traumatismo nos dentes e fraturas do processo alveolar são comuns e devem ser consideradas situações de emergência, pois o resultado depende do pronto atendimento à lesão. O período de estabilização (imobilização) para dentes reimplantados maduros é de

- (A) 7 a 10 dias.
- (B) 15 a 21 dias.
- (C) 4 semanas.
- (D) 5 semanas.

QUESTÃO 48

A sialoadenose é uma doença não inflamatória incomum caracterizada pelo aumento de volume das glândulas salivares, particularmente envolvendo as glândulas parótidas. A condição é frequentemente associada a um problema sistêmico, que pode ser de origem endócrina, nutricional ou neurogênica. A condição endócrina e neurogênica associadas são

- (A) a anorexia nervosa e a droga psicotrópica.
- (B) o diabetes melito e a droga anti-hipertensiva.
- (C) a cirrose e a droga simpaticomimética.
- (D) a bulimia e a droga parassimpática.

QUESTÃO 49

Etimologicamente, síntese significa reunir, juntar. Entende-se por síntese o conjunto dos métodos usados para a coaptação das bordas de uma ferida traumática ou cirúrgica, com o objetivo de restituir a função e acelerar o reparo por primeira intenção, que é a sutura. Outra função da sutura, além de reunir as bordas da ferida, é favorecer a hemostasia e eliminar os espaços mortos. Atualmente, estão disponíveis vários tipos de materiais para sutura. É considerado um fio de sutura absorvível

- (A) o nylon.
- (B) o polipropileno.
- (C) a polidioxanona.
- (D) o poliéster.

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

Paciente, 45 kg, sexo feminino, saudável. Em um procedimento, o cirurgião - dentista utilizou anestésico local: mepivacaína 2% com levonordefrina 1:20.000 (dose máxima recomendada - Mepivacaína 4,0mg/kg). Ela recebeu dois tubetes, porém a anestesia foi inadequada. O profissional resolveu mudar para articaína, 4% com epinefrina 1:100.000 (dose máxima recomendada - Articaína 7,0mg/kg).

Qual a quantidade de articaína em tubetes essa paciente ainda pode receber?

- (A) 1,5.
- (B) 2,0.
- (C) 2,5.
- (D) 3,5.