

RESPOSTA ESPERADA PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Posse-GO.

CARGO: Cirurgião-Dentista

Questão 01

Deve-se iniciar o procedimento com a escariação com escavadores de dentina e, se for realizado sem anestesia, quando o paciente acusar sensibilidade, deve-se suspender a operação. Sequencialmente, isola-se o dente com rolos de algodão (isolamento relativo), irrigando a cavidade com solução de hidróxido de cálcio. Seca-se a cavidade com algodão esterilizado e aplica-se pasta de hidróxido de cálcio no assoalho da cavidade, vedando a cavidade com cimento de ionômero de vidro do tipo restaurador. Aguarda-se aproximadamente entre 45 e 60 dias, a fim de esperar o tempo de recuperação da polpa, mantendo-a em repouso, solicitando radiografia para acompanhamento. Estando o dente assintomático, com TVP positivo, o tratamento expectante deve ser removido e a cavidade deve ser preparada para receber o material restaurador definitivo. Promove-se a proteção da cavidade com cimento de hidróxido de cálcio, podendo adicionar uma camada de cimento de ionômero de vidro forrador, realizando restauração definitiva com resina composta ou amálgama. Caso o paciente apresente sintomatologia dolorosa ou TVP negativo, representando insucesso do tratamento expectante, o paciente deverá ser indicado para tratamento endodôntico. São objetivos desse tratamento: bloquear as agressões que atingem a polpa através da cavidade de cárie, via túbulos dentinários; remineralizar parte da dentina descalcificada remanescente; interromper o circuito metabólico proporcionado pelos fluidos bucais às bactérias do tecido cariado; hipermineralizar a dentina sadia subjacente; estimular a formação de dentina terciária ou reparadora.

Goiânia, 16 de agosto de 2024.