

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS – 2025

R1 COM PRÉ-REQUISITO EM PEDIATRIA

CADERNO DE QUESTÕES 01/12/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Conhecimentos sobre Pediatria	01 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Ter audácia na mente é abrir-se para novos caminhos.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

PROCESSO SELETIVO

Leia o **Caso Clínico 1** para responder às questões de **01 a 04**.

Caso Clínico 1

Crianças e adolescentes ao apresentarem quadro de miocardite viral, mostram-nos certas particularidades na sua etiologia e, ao mesmo tempo, têm seu diagnóstico subestimado.

QUESTÃO 01

Qual a principal etiologia das miocardites virais?

- (A) Parvovírus B19.
- (B) Enterovírus.
- (C) Coxsackievírus.
- (D) Herpes-vírus.

QUESTÃO 02

Qual sintoma faz parte dentre os achados clínicos específicos, mais comuns das miocardites em escolares e adolescentes, além dos sinais de insuficiência cardíaca e história prévia de doença viral?

- (A) Febre.
- (B) Choque.
- (C) Dor torácica.
- (D) Fadiga muscular.

QUESTÃO 03

Qual é o achado clínico inespecífico comumente encontrado em crianças pré-escolares, na apresentação inicial da miocardite?

- (A) Letargia.
- (B) Irritabilidade.
- (C) Hiporexia.
- (D) Arritmia.

QUESTÃO 04

Uma vez feito o diagnóstico de miocardite aguda, qual o principal tratamento a ser imediatamente instituído e que contribuirá com a recuperação da função ventricular da criança?

- (A) Adrenalina.
- (B) Atropina.
- (C) Dopamina.
- (D) Imunoglobulina.

Leia o **Caso Clínico 2** para responder às questões **05 e 06**.

Caso Clínico 2

Uma mãe vai ao pediatra do seu filho solicitar um atestado de aptidão para a prática de exercícios físicos para a criança, que não pôde ir à consulta porque tinha prova na escola, no mesmo horário.

QUESTÃO 05

De acordo com a procedência, este atestado solicitado é um atestado

- (A) administrativo.
- (B) judiciário.
- (C) manipulado.
- (D) oficioso.

QUESTÃO 06

O pediatra, ao fornecer o atestado a esta mãe, neste momento

- (A) agiu corretamente, de acordo com o código de ética médica.
- (B) cometeu uma ação criminosa, podendo ser preso.
- (C) atuou conforme é preconizado pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
- (D) feriu o princípio da isonomia, defendido pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).

QUESTÃO 07

A hebiatria é uma subespecialidade da pediatria, que atende os adolescentes, porém não existe um consenso entre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) em relação à abrangência desta subespecialidade. Segundo a OMS, a adolescência abrange crianças entre quais idades?

- (A) 10 e 19 anos.
- (B) 12 e 16 anos.
- (C) 12 e 18 anos.
- (D) 16 e 21 anos.

QUESTÃO 08

Conforme avaliação da puberdade, uma menina que apresenta mama com aréola e papila formando um contorno secundário, destacando-se do resto da mama, encontra-se no estágio

- (A) 1.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.

QUESTÃO 09

Um menino que apresenta o pênis com maior comprimento, escroto já escuro e com tamanho acentuado, de acordo com a avaliação da puberdade, encontra-se no estágio

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 10

Leia o caso a seguir.

Uma criança de oito anos de idade foi diagnosticada com CIV (comunicação interventricular).

A partir do caso apresentado, o paciente possui qual tipo de sopro cardíaco?

- (A) Vibratório de Still.
- (B) De ejeção pulmonar.
- (C) Sistólico supraclavicular.
- (D) Zumbido venoso.

QUESTÃO 11

Leia o caso a seguir.

Um bebê foi diagnosticado com tetralogia de Fallot após o nascimento.

Esta é uma cardiopatia com

- (A) shunt esquerda-direita.
- (B) circulação em paralelo.
- (C) fluxo sistêmico canal-dependente.
- (D) fluxo pulmonar canal-dependente.

QUESTÃO 12

O tratamento inicial para uma criança diagnosticada com tetralogia de Fallot é feito com

- (A) diurético.
- (B) adrenalina.
- (C) milrinone.
- (D) prostaglandina.

QUESTÃO 13

Qual é a principal etiologia da endocardite infecciosa em pediatria?

- (A) Vírus.
- (B) Bactéria.
- (C) Fungo.
- (D) Micobactéria.

QUESTÃO 14

Qual é o exame utilizado para o diagnóstico de endocardite infecciosa em crianças?

- (A) Hemograma.
- (B) VHS.
- (C) Raio X de tórax.
- (D) Ecocardiograma.

QUESTÃO 15

A coqueluche é uma doença comum da infância, causada pela bactéria

- (A) *Rickettsia*.
- (B) *Bordetella pertussis*.
- (C) *Chlamydia trachomatis*.
- (D) *Mycoplasma pneumoniae*.

QUESTÃO 16

Qual é a principal causa de diarreia aguda em crianças menores de cinco anos no Brasil?

- (A) Rotavírus.
- (B) Ameba.
- (C) Salmonella.
- (D) *Escherichia coli*.

QUESTÃO 17

Segundo a SBP, qual vacina deve ser administrada em bebês com pelo menos 2kg, após o nascimento, antes de um mês de vida?

- (A) Hepatite B.
- (B) BCG.
- (C) DTPa.
- (D) Hib.

QUESTÃO 18

Qual é a idade aceitável para a introdução de alimentos sólidos na dieta dos bebês nascidos prematuramente ou com comorbidades?

- (A) 2 meses.
- (B) 3 meses.
- (C) 4 meses.
- (D) 9 meses.

QUESTÃO 19

Qual a principal recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para o manejo da febre em crianças?

- (A) Dar anticonvulsivante como profilaxia.
- (B) Vigiar a temperatura e dar antipirético, se necessário.
- (C) Levar a criança ao pediatra antes de dar qualquer remédio.
- (D) Administrar compressas frias com álcool, inicialmente.

QUESTÃO 20

Qual é o principal objetivo do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na infância?

- (A) Identificar doenças crônicas.
- (B) Prevenir a obesidade.
- (C) Diagnosticar variações comportamentais.
- (D) Detectar alterações no desenvolvimento.

QUESTÃO 21

Quantas consultas ao pediatra a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda no primeiro ano de vida do bebê?

- (A) 3.
- (B) 6.
- (C) 9.
- (D) 12.

QUESTÃO 22

Segundo a AAP (Academia Americana de Pediatria), qual é o principal fator de risco para a síndrome de morte súbita infantil?

- (A) A administração de fórmulas hidrolisadas.
- (B) A posição ventral para o bebê dormir.
- (C) O ar-condicionado no quarto do bebê.
- (D) O uso de chupetas precocemente.

QUESTÃO 23

Qual vacina é recomendada para prevenir a infecção por *Haemophilus influenzae* tipo B?

- (A) Tríplice viral.
- (B) BCG.
- (C) Hepatite B.
- (D) Hib.

QUESTÃO 24

Qual é o fator determinante para o desenvolvimento da síndrome do bebê sacudido?

- (A) Estresse parental.
- (B) Prematuridade.
- (C) Macrossomia fetal.
- (D) Mal epiléptico.

QUESTÃO 25

Até quantos meses de vida o bebê deve ficar em aleitamento materno exclusivo, segundo as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)?

- (A) 2 meses.
- (B) 4 meses.
- (C) 6 meses.
- (D) 12 meses.

QUESTÃO 26

Qual é o exame padrão ouro para o diagnóstico de asma em crianças?

- (A) Espirometria.
- (B) Raio X do tórax.
- (C) Teste de alergia.
- (D) TC (tomografia computadorizada) do pulmão.

QUESTÃO 27

O que é a síndrome de Turner?

- (A) Uma anomalia cromossômica.
- (B) Uma doença autoimune.
- (C) Um distúrbio metabólico.
- (D) Uma doença viral.

QUESTÃO 28

Qual a principal causa de pneumonia em crianças menores de cinco anos?

- (A) Pneumococo.
- (B) Estreptococo.
- (C) *Mycoplasma*.
- (D) Fungos.

QUESTÃO 29

Qual é o hormônio responsável pelo crescimento das crianças?

- (A) O cortisol.
- (B) A insulina.
- (C) A somatotropina.
- (D) A tiroxina.

QUESTÃO 30

Qual a principal causa de anemia ferropriva em crianças?

- (A) Hemorragias.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Dieta pobre em ferro.
- (D) Deficiência de vitamina B12.

QUESTÃO 31

Qual é a faixa etária recomendada para receber a vacina contra varicela, de acordo com o calendário nacional de vacinação?

- (A) 6 a 9 meses.
- (B) 1 a 2 anos.
- (C) 4 a 6 anos.
- (D) 10 a 12 anos.

QUESTÃO 32

Qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento da asma?

- (A) Baixo peso ao nascer.
- (B) Exposição a alérgenos.
- (C) Uso indiscriminado de antibióticos.
- (D) Ingestão de alimentos processados.

QUESTÃO 33

Em relação ao desenvolvimento infantil, qual é a principal habilidade esperada aos 12 meses de vida?

- (A) Falar palavras simples.
- (B) Imitar ações.
- (C) Soltar objetos.
- (D) Andar sozinho.

QUESTÃO 34

Qual é a principal característica da doença celíaca na faixa etária pediátrica?

- (A) Autoimunidade ao glúten.
- (B) Aganglionose intestinal.
- (C) Polipose difusa.
- (D) Intolerância à lactose.

QUESTÃO 35

Qual condição pode causar icterícia neonatal à custa de bilirrubina indireta?

- (A) Hepatite.
- (B) Desidratação.
- (C) Doença hemolítica.
- (D) Alergia alimentar.

QUESTÃO 36

Qual deve ser o tratamento inicial para uma criança com crise asmática leve?

- (A) Corticoesteroide sistêmico.
- (B) Broncodilatador de ação rápida.
- (C) Oxigenioterapia.
- (D) Antibioticoterapia.

QUESTÃO 37

Qual é a principal causa de tosse crônica em crianças?

- (A) Asma.
- (B) Alergia.
- (C) Doença do refluxo.
- (D) Infecções respiratórias.

QUESTÃO 38

Qual é a condição associada ao uso inadequado de antibióticos na infância?

- (A) Alergias.
- (B) Vômitos.
- (C) Infecção intestinal.
- (D) Resistência bacteriana.

QUESTÃO 39

Qual a principal causa de mortalidade infantil?

- (A) Acidentes automobilísticos.
- (B) Infecções.
- (C) Neoplasias.
- (D) Doenças genéticas.

QUESTÃO 40

Qual é a característica clínica mais específica da síndrome nefrótica em crianças?

- (A) Hipertensão arterial.
- (B) Hematúria importante.
- (C) Proteinúria significativa.
- (D) Edema pulmonar.

QUESTÃO 41

Qual é o exame adequado para o diagnóstico de fibrose cística?

- (A) Eletroforese de hemoglobinas.
- (B) Ressonância magnética de crânio.
- (C) Tomografia computadorizada de pulmão.
- (D) Teste do suor.

QUESTÃO 42

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, aos 18 meses, espera-se que a criança

- (A) ande para trás.
- (B) use palavras de duas sílabas.
- (C) faça torre com três blocos.
- (D) identifique partes do corpo.

QUESTÃO 43

Qual deve ser o tratamento inicial para uma criança com quadro agudo de febre alta e convulsão?

- (A) Benzodiazepínico.
- (B) Antipirético.
- (C) Antibiótico.
- (D) Corticoesteroide.

QUESTÃO 44

A condição que se faz mais presente junto às crianças com síndrome de Down é

- (A) a cardiopatia congênita.
- (B) o diabetes tipo 1.
- (C) o hipotireoidismo.
- (D) a fibrose cística.

QUESTÃO 45

Qual é a principal manifestação extra-articular em crianças com artrite idiopática juvenil?

- (A) Hepatomegalia.
- (B) Lesão cutânea.
- (C) Nefropatia.
- (D) Uveíte.

QUESTÃO 46

Qual é a principal complicação da obesidade infantil a longo prazo?

- (A) Dislipidemias.
- (B) Apneia do sono.
- (C) Hipertensão arterial.
- (D) Diabetes tipo 2.

QUESTÃO 47

Diante de uma criança com quadro de gastroenterite aguda, o principal parâmetro que deve ser monitorado na evolução da doença é

- (A) o peso.
- (B) a hidratação.
- (C) a temperatura corporal.
- (D) a frequência cardíaca.

QUESTÃO 48

Qual é a alteração encontrada no hemograma de uma criança com anemia ferropriva?

- (A) Leucocitose.
- (B) Hipocromia.
- (C) Policitemia.
- (D) Trombocitopenia.

QUESTÃO 49

Qual é o manejo adequado para uma criança com rinite alérgica?

- (A) Corticoide oral.
- (B) Descongestionante tópico.
- (C) Anti-histamínicos.
- (D) Antibióticos.

QUESTÃO 50

Qual é a principal causa de insuficiência respiratória aguda em lactentes?

- (A) Bronquiolite.
- (B) Pneumonia viral.
- (C) Asma.
- (D) Intoxicação exógena.

RASCUNHO