

RESPOSTA ESPERADA PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do Município de Senador Canedo-GO

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – ORTODONTISTA

____ Questão 01 _____

(Item 1) A extração seriada é direcionada para apinhamentos graves superiores a 10mm e quando não há problemas esqueléticos. **(Item 2)** Se o apinhamento for grave, um pouco de espaço permanecerá após o alinhamento dos dentes, o que significa que haverá pouca inclinação e movimentação não controlada dos dentes adjacentes em direção ao espaço da extração.

(Item 3) O tratamento com extração seriada inicia-se na dentadura mista precoce com a extração dos incisivos decíduos caso necessário, seguida pela extração dos caninos decíduos, para permitir a erupção e o alinhamento dos incisivos permanentes. Após a extração dos caninos decíduos, problemas de apinhamento geralmente ficam sob controle por 1 ou 2 anos, mas é necessário acompanhamento.

(Argumento 1) O objetivo é influenciar os primeiros pré-molares permanentes a erupcionarem antes dos caninos, de maneira a poderem ser extraídos e os caninos se movimentarem distalmente em direção a esse espaço. Os pré-molares superiores geralmente erupcionam antes dos caninos, então a sequência de erupção raramente é um problema na arcada superior. Na arcada inferior, entretanto, os caninos geralmente erupcionam antes dos primeiros pré-molares, o que faz com que os caninos sejam deslocados para vestibular. Para evitar isso, o primeiro molar inferior decíduo deve ser extraído quando há entre metade e dois terços de formação radicular do primeiro pré-molar. Isso geralmente acelerará a erupção dos pré-molares e fará com que eles entrem na arcada antes do canino. Depois de o primeiro pré-molar ter sido extraído, os segundos molares decíduos devem esfoliar normalmente. Os espaços da extração de pré-molares fecham-se parcialmente com o deslocamento mesial dos segundos pré-molares e primeiros molares permanentes, mas em grande parte com a erupção distal dos caninos.

(Argumento 2) A abordagem da extração seriada apresenta benefício de encurtamento do tratamento corretivo, número de visitas reduzidas ao atendimento clínico e menor custo biológico da movimentação dentária. **(Argumento 3)** Entretanto, os pacientes devem ser selecionados e supervisionados cuidadosamente durante seu desenvolvimento. Caso a extração seriada não seja seguida de mecanoterapia, o alinhamento ideal, o posicionamento radicular, a correção da mordida profunda e o fechamento de espaços geralmente não são alcançados. A impacção do primeiro pré-molar pode ser uma complicação caso o primeiro molar decíduo seja extraído e o primeiro pré-molar ainda não erupcionar antes do canino, necessitando de posterior remoção cirúrgica por enucleação.



Observação sobre a pontuação:

A pontuação no critério **Avaliação de Conteúdo** será atribuída considerando os itens e argumentos mencionados pelo candidato que estejam condizentes com estes relacionados na resposta esperada.

Goiânia, 30 de junho de 2026.